

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ. (Σταδίου εως T2) ΜΕ BCG ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ

Οι ασθενείς θα υποβάλλονται σε 8 εβδομαδιαίες εγχύσεις BCG και Ιντερφερόνης 2α εναλλάξ αρχίζοντας πρώτα με BCG και στη συνέχεια με 100.000.000 μονάδες Ιντερφερόνης. Μετά την συμπλήρωση των 8 εβδομάδων θα ακολουθεί μία μηνιαία έγχυση BCG και τον επόμενο μήνα θα γίνει έγχυση 60.000.000 μον. Ιντερφερόνης έως οτου συμπληρωθεί ένας χρόνος. Τον πρώτο, τρίτο, έκτο, ένατο και δωδέκατο μήνα ο ασθενής θα κάνει 1) γενική αίματος και 2) βιοχημικό έλεγχο ηπατικής λειτουργίας (SGOT, SGPT, αλκαλική φωσφατάση, γGT). Τον τέταρτο, όγδοο και δωδέκατο μήνα θα γίνεται κυστεοσκόπηση στα Τακτικά Ιατρεία απο τον Θεράποντα Ιατρό.

Επι υποτροπής της νόσου σε διάστημα μικρότερο του πρώτου έτους, μετα την ενδοσκοπική αφαίρεση του όγκου θα ακολουθούν 6 εβδομαδιαίες εγχύσεις με BCG, και στη συνέχεια θα γίνεται το ίδιο σχήμα με τις εναλλάξ μηνιαίες εγχύσεις BCG και Ιντερφερόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η κυστεοσκόπηση δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την έγχυση του BCG.

Όνοματεπώνυμο ασθενούς:

A.M:

1η εβδομάδα:

2η εβδομάδα:

3η εβδομάδα:

4η εβδομάδα:

Γενική αίματος:

Βιοχημικά:

5η εβδομάδα:

6η εβδομάδα:

7η εβδομάδα:

8 εβδομάδα:

1η μηνιαία:

Γενική αίματος:

Βιοχημικά:

2η μηνιαία:

Κυστεοσκόπηση:

3η μηνιαία:

4η μηνιαία:

5η μηνιαία:

Γενική αίματος;
Βιοχημικά:

6η μηνιαία:

Κυστεοσκόπηση:

7η μηνιαία:

Γενική αίματος
Βιοχημικά:

8η μηνιαία:

9η μηνιαία:

10η μηνιαία:

Κυστεοσκόπηση:

2ος χρόνος:

3ος χρόνος:

