

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΣΧΗΜΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διάρκει τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

1^η Ημέρα (Κορτιζόνη)

Tabl. Medrol 4mg, S:1 X 3 (πρωί – μεσημέρι – βράδυ)

2^η Ημέρα (Κορτιζόνη + Αντιισταμινικό)

Tabl. Medrol 4mg, S:1 X 3 (πρωί – μεσημέρι – βράδυ)

Tabl. Zirtec 10 mg ή Tabl. Xozal 5 mg ή Aerius 5 mg, S:1 X 2 (πρωί – βράδυ)

3^η Ημέρα (Κορτιζόνη + Αντιισταμινικό)

Tabl. Medrol 4mg, S:1 X 3 (πρωί – μεσημέρι – βράδυ)

Tabl. Zirtec 10 mg ή Tabl. Xozal 5 mg ή Aerius 5 mg, S:1 X 2 (πρωί – βράδυ)

Ο/η εξεταζόμενος/-η τις ημέρες που λαμβάνει το σχήμα απευαισθητοποίησης (κορτιζόνη και αντιισταμινικό φάρμακο) θα πρέπει:

- Να περιορίσει τη διατροφική πρόσληψη αλατιού και ζάχαρης.
- Να μην οδηγεί ή να χειρίζεται μηχανήματα.

Ο/Η εξεταζόμενος/-η την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να συνοδεύεται.

Υπογραφή Ιατρού